


ジュウイチ

| | | |
|-------|------------------------------|----------|
| 学名 | Cuculus fugax Horsfield,1821 | |
| 目名 | カッコウ目 | |
| 目名学名 | CUCULIFORMES | |
| 科名 | カッコウ科 | |
| 科名学名 | Cuculidae | |
| カテゴリー | 大分県：Ⅱ (VU) | 環境省：掲載なし |



【選定理由】

九州中央山地が繁殖南限で、祖母・傾山系、くじゅう連山は、ほぼ繁殖南限に位置する。生息数は、他のカッコウの仲間よりもかなり少ない。

| | |
|-------|---|
| 県内分布 | 山地の他のカッコウの仲間よりも標高の高いところに生息する夏鳥。 |
| 分布域 | 北海道, 本州, 四国, 九州中部以北の山地に夏鳥。 |
| 世界的分布 | 中国全域, 東北部で繁殖, 東南アジア全域で留鳥。 |
| 生息環境 | 低山から亜高山帯の落葉広葉樹林や針広混交林に生息し, おもに, コルリやオオルリおよび小型ヒタキ類に托卵する。樹冠部で毛虫を取って食べる。 |
| 現状 | かつては年に5~10回程度の観察記録があったが, 最近では観察頻度が少なくなっている。 |
| 備考 | |