

勝乃藤（かつのふじ）


黒原6584(87.1)
生年月日:令和3年9月28日
繁殖者:杵築市　合同会社阿部牧場
個体識別番号:13950-9588-6
遺伝病:10形質フリー
骨格粗大症(SD):保因なし
直接検定DG:1.44kg

勝乃幸 黒原5630(84.3) (長崎・平戸)	勝乃勝 黒原4415(88.9) (長崎・壱岐)	平茂勝	第20平茂
		むつき	平茂勝
	ゆきこ 黒2059427(79.8) (鹿児島・熊毛)	金幸	金徳
		としえ	神高福
もり27 黒2524438(84.0) (大分・杵築)	隆茂38 黒13454(84.1) 黒高2027 (大分・竹田)	隆茂福	隆美
		いとみ	安福(岐阜)
	もり11 黒2416146(79.2) (大分・杵築)	藤平茂(大分)	平茂勝
		もり133	寿恵福

■枝肉6形質　期待育種価　　近交係数　5.81%

枝肉重量	C	ロース芯面積	B	バラ厚	A
期待育種価	評価日	期待育種価	評価日	期待育種価	評価日
51.223	R8.4	20.585	R8.4	1.310	R8.4
皮下脂肪厚	**B**	**歩留基準値**	**A**	**BMS No.**	**H**
期待育種価	評価日	期待育種価	評価日	期待育種価	評価日
-0.627	R8.4	3.566	R8.4	3.324	R8.4

SNP系統分類グループ:S11(「平茂勝」等)



現場後代検定実施中（令和8年度後期終了予定）



県農協肥育部会第26回枝肉研究会　優秀賞

現場後代検定調査牛
（大分県農協肥育牛部会第26回枝肉研究会）
性別:雌
血統:勝乃藤-平福安-安茂勝
枝肉重量:485.4kg
ロース芯面積:91㎠
バラの厚さ:9.1cm
皮下脂肪の厚さ:2.6cm
歩留基準値:79.0

用語解説

- **遺伝的不良形質**
  現在、黒毛和種で遺伝子診断が可能な遺伝的不良形質には次のものがあります。 本パンフレットでは1～10の遺伝病および骨格粗大症(SD)の保因状況を明記しています。


1. バンド3欠損症(B3)
2. クローディン16欠損症(CL16)
3. IARS異常症(IARS)
4. 前肢帯筋異常症(FMA)
5. 眼球形成異常症(MOD)
6. 血液凝固第13因子欠損症(F13)
7. モリブデン補酵素欠損症(MCSU)
8. チェディアック・ヒガシ症候群(CHS)
9. メラニン細胞刺激ホルモン受容体(MSHR)
10. バーター症候群1型(BAS1)
11. 骨格粗大症(SD)

※上記の遺伝的不良形質は単純劣勢遺伝様式をとります。保因種雄牛を交配する際は、同病の保因が疑われる雌牛を避けることで、発症を防ぐことができます。

- **直接検定DG**
  直接検定期間112日間の1日あたり増体量を表示しています。

- **育種価評価(BV)**
  子牛が生まれつき親から授かった遺伝的能力のことで、下表に示す平均値から、どの程度優れているか(劣っているか)を数値で表したものです。
  通常、後代の成績と血統情報から統計遺伝学的に算出して**「推定育種価」**として表記しますが、算出出来ない場合は、両親の育種価から計算した**「期待育種価」**や祖父母の育種価から計算した**「期待の期待育種価」**などで表されることもあります。
  大分県では、(公社)全国和牛登録協会の計算した育種価を採用しており、本パンフレットには、枝肉の6形質(枝肉重量、ロース芯面積、バラ厚、皮下脂肪厚、歩留基準値、脂肪交雑基準値)の育種価を掲載しています。

- **SNP系統分類(ストラクチャー分析)**
  種雄牛のSNP型情報を用いた分析結果に基づき、ゲノム構成の似通いに応じて分類したもので、従来の血統情報ではわからなかったDNAレベルでの特徴や似通いを考慮した系統分類です。
  集団をS1～S17の17集団(系統)と仮定し、最大のゲノム構成割合に基づきS1～S17のグループに分類されます(最大のゲノム構成割合が30%未満の場合は、S00(未分類)として表示)
  下図は、17グループの関係を遺伝的距離に置き換えて表したもので、グループ同士をつなぐ線はグループ間の個体の平均的な遺伝的距離を示しています。



(参考:公益社団法人全国和牛登録協会「SNP系統分類(ストラクチャー分析)について」
https://www.zwtk.org/snp/index.html)