


水稲は**苗半作**、健全な育苗を行いましょ！

<浸種・催芽について>


- ・浸種日数は、**100℃÷水温**(10～15℃)
- ・催芽は、適正な鳩胸状態で完了する！



<移植タイミングについて>

- ・一般的な苗(稚苗)では、育苗日数**20日**程度が移植適期！

移植タイミングの遅れは、本田への「**活着**」を悪くし、**莖数の減少**等につながります！



※移植タイミングは、育苗方法や育苗時期によって変わるので、注意が必要です。

<箱処理剤の活用について>

- ・本田初期の病虫害防除として、**省力化**につながります！

<例>	薬剤名	主な対象害虫					WCS用稲 使用可否
		紋枯病	いもち病	ウンカ類	イネドロ オイムシ	イネミズ ゾウムシ	
	防人箱粒剤		○	○	○	○	○
	スクラム箱粒剤	○	○	○	○	○	○
	ブーンハーデス箱粒剤	○	○	○	○	○	



←紋枯病の症状

↑ 特に「紋枯病」は昨年多発しました。主食用稲では、特に「スクラム」や「ブーンハーデス」がオススメです！

3月の水稲勉強会は**水稲の育苗**です！

- ・3月12日(木) 18:00から、豊肥振興局・大会議室にて行います。
- ・参加の申し込みは豊肥振興局 集水二班(63-1301)までご連絡下さい！



豊肥振興局HPからカラーで見れます！

大分県農業協同組合豊肥営農経済センター 営農部 農産課 63-4994
大分県豊肥振興局生産流通部 集落営農・水田畑地化第二班 63-1301