



○早刈り・刈り遅れにならない適期収穫を目指しましょう！

・竹田市(標高261m)の気温から、目安となる収穫時期を算出しました。


品種	ひとめぼれ(つや姫)			ヒノヒカリ			
出穂期	7月25日	8月1日	8月5日	8月5日	8月15日	8月25日	8月30日
成熟期	9月1日	9月9日	9月13日	9月16日	9月27日	10月8日	10月5日

※あくまでも予測です！ 標高や今後の気候で変化します。
収穫適期は、以下の点を確認しましょう！

【品種ごとの収穫適期表】

品種	青粳率	積算温度
ヒノヒカリ	20～25%	950℃
ひとめぼれ	20%	900℃
なつほのか	10～15%	1050℃
つや姫	15～20%	1000℃

【収穫適期の穂のようす】



※積算温度：出穂期以降の日平均気温を積算した温度

早刈りの影響

- ・未熟粒が増加し、収量低下
- ・貯蔵時に虫害の発生増加

遅刈りの影響


- ・茶米や胴割米の増加による品質低下
- ・倒伏や獣害の増加

竹田では特に**刈り遅れ**が多いため、注意しましょう！

○収穫前、水管理の注意点！

- ・落水が早いと、乳白米・胴割米の増加や収量低下につながるため、

間断灌水を**収穫1週間前**まで行いましょう



○乾燥の注意点！

胴割米



〈注意点〉	〈影響〉	〈対策〉
過乾燥・急乾燥	→ 胴割米の増加 食味の低下	→ 乾燥時のスピードは、 毎時の乾減率0.8%/hr以下
乾燥不足	→ 品質の低下	→ 乾燥後水分は14.5～15%

