


令和2年度 作物栽培管理情報第4号

令和2年7月発行
大分県中部振興局 集落営農・農地活用班

1. 令和2年産水稻 夏～秋の病害虫対策等

1) 病害虫対策 ～発生状況に注意し、適切に防ぎましょう～

(1) トビイロウンカ対策 ※一株に成虫又は幼虫が数頭みつかったらすぐ防除！



ポイント

昨年はトビイロウンカの多発により作柄が大きく低下しました！！
本年も飛来情報及び発生状況に注意し、被害防止に努めましょう！

①ウンカ類に登録のある殺虫剤 ※熟期の遅い品種には追加防除が必要です！

主食用米・飼料用米・WCS用水稻に使える殺虫剤一覧


農薬名	使用量/10a	収穫前制限日数
スタークル液剤10	1000倍 (60～150L)	収穫7日前まで
アルバリン顆粒水溶剤	3000倍 (60～150L)	収穫7日前まで
スタークル顆粒水溶剤	3000倍 (60～150L)	収穫7日前まで
ダントツ水溶剤	4000倍 (60～150L)	収穫7日前まで
トレボン粉剤DL	3～4kg	収穫7日前まで
トレボン乳剤	1000～2000倍 (60～150L)	収穫14日前まで
バストガード水溶剤	2000～4000倍 (60～150L)	収穫14日前まで

*参考 散布水量別使用量

希釈倍率	散布水量/10a		
	60L	100L	150L
4000倍	15ml	25ml	38ml
3000倍	20ml	33ml	50ml
2000倍	30ml	50ml	75ml
1000倍	60ml	100ml	150ml

- ・散布する場合は、株元まで確実に薬剤がかかるようにしましょう (多めにかかる位にしっかりと)。
- ・基幹防除とあわせて散布する場合は、ウンカ類の防除適期を優先させてください。

②坪枯れ圃場の収穫 ※無事な部分を速やかに刈取り被害を抑えましょう！



(2) その他の病害虫対策 ※毎年発生する圃場は本年も注意が必要です！



・葉色が濃い、生育が軟弱徒長気味の圃場は特に注意してください。


2) 気象条件に合わせた水管理 ~順調な生育は株元から~
ポイント

(1) 曇り・雨で気温が低い場合 ※軟弱徒長気味の水稲を引き締めましょう！

- ①浅水管理
 - ②間断灌水の徹底
 - ③溝切りによる排水不良解消
- } による、軟弱徒長の防止

・軟弱徒長気味の圃場では、いもち病・ウンカ類の防除も確実にいきましょう。

(2) 晴れで気温が高い場合 ※圃場を温水プール状態にしないことが重要です！



3) 台風が来そうな場合の注意点 ~対策は事前に、過ぎ去るまで待機！~

ポイント

- ・予報が出たらすぐに対策を
- ・接近時から通過後は自宅で待機
- ・河川や水路、畦畔等には絶対行かないこと！
- ・通過後の排水対策及び病害虫防除の徹底

病害虫・気象災害対策の最新情報をお知らせします！

随時登録受付中

農業情報メール配信

1. 配信受付アドレス 11604@pref.oita.lg.jp
2. お知らせ頂く内容
 - 1) お名前 2) 郵便番号
 - 3) 御住所 4) 御職業

※農業情報メール配信以外には使用しません。