



# 令和2年度 作物栽培管理情報第3号

令和2年6月発行  
大分県中部振興局 集落営農・農地活用班

## 1. 令和2年産水稻 生育期の管理作業（後編）

### 1) 出穂期前後の水管理 ～稲が必ず水を必要とする期間です！～

#### ポイント



- ・稲が玄米を作る期間です。水を切らさないようにしましょう。
- ・乳白米などの高温障害が発生しやすい時期でもあります。気温の高い日は、かけ流し灌水により稲を冷やしましょう。
- ・台風やフェーン現象が発生した時には前もって湛水し、脱水による穂の枯れ上がりを防ぎましょう。

### 2) 病虫害防除 ～収量・品質を落とす原因を確実に防ぎましょう！～

#### ポイント ※散布前に農薬ラベルの注意事項を確認しましょう。

#### (1) 仕上げ防除

- ①いもち病（穂いもち）・**ウンカ類の防除適期は、穂ばらみ期～穂揃い期です。**
- ②防除時期・薬剤

| 剤型 | 薬剤名                       | 散布時の注意           |         | 使用上の注意  |         |
|----|---------------------------|------------------|---------|---------|---------|
|    |                           | 使用量/10a<br>・希釈倍率 | 散布量/10a | 使用時期    | 回数      |
| 液剤 | ビームエイトスタークルヅル             | 1000倍            | 60～150L | 収穫7日前まで | 3回以内    |
|    | <b>(新剤) ブレードスタークルヅル</b>   |                  |         |         | 2回以内    |
|    | ダブルカットスタークルヲロアブル          |                  |         |         | 60～200L |
| 粉剤 | ビームスタークル粉剤5DL             | 3～4kg            | —       | 収穫7日前まで | 3回以内    |
|    | <b>(新剤) ブレードスタークル粉剤DL</b> |                  |         |         | 2回以内    |
|    | ダブルカットスタークル粉剤DL           |                  |         |         | 穂揃い期まで  |

注意⇒病虫害の注意報が出た場合は、予防のため湛水し粒剤を散布しましょう。

#### (2) 稲こうじ病（玄米汚損の原因）防除

- ①紋枯病と同様、前年発生した圃場で多発します。
- ②防除時期・薬剤

| 防除時期      | 薬剤名                   | 散布時の注意           |              | 使用上の注意   |    |
|-----------|-----------------------|------------------|--------------|----------|----|
|           |                       | 使用量/10a<br>・希釈倍率 | 散布量/10a      | 使用時期     | 回数 |
| 出穂20～10日前 | Zボルドー粉剤DL<br>ドイツボルドーA | 3～4kg<br>2000倍   | —<br>60～150L | 出穂10日前まで | —  |

※防除適期が非常に短いので、前もって防除する日を決めておきましょう！

#### (3) 畦畔の草刈によるカメムシ防除

出穂の2週間前頃に行い、カメムシの居場所をなくしましょう。

注意⇒出穂前後では、逆に圃場内に追いつむため注意しましょう！