

麦類

(1) 播種前および播種後出芽前茎葉処理剤

薬剤名	成分名	含有%	備考
ラウンドアップマックスロード	グリホサートカリウム塩	48	

(2) 播種後土壤処理剤 (その1)

薬剤名	成分名	含有%	備考
カイタック乳剤 (小麦)(大麦)	ベンディメタリン リニュロン	15 10	①スズメノテッホウやキク科雑草が多発する圃場では、6kg/10a散布する。 ②砂質土壌では使用しない。 ③麦出芽後は使用しない。
【他の剤型】 細粒剤F (小麦)(大麦)	ベンディメタリン リニュロン	1.5 1	
ガレース乳剤 (小麦)(大麦) 【他の剤型】 G (小麦)(大麦)	ジフルフェニカン トリフルラリン ジフルフェニカン トリフルラリン	3.7 37 0.15 2	①砂質土壌では使用しない。 ②ヤエムグラに対して効果あり。 ③丁寧な覆土と処理量の厳守(薬害)。 ④土壌残効が長いので年内中に散布を終える。 ⑤葉の白化が見られる場合があるが、その後の生育に影響はない。
キックボクサー細粒剤F (小麦)(大麦)	プロスルホカルブ リニュロン	7 1.75	①麦類に一過性の薬害(黄斑、縮葉、生育抑制)を生ずることがあるが、その後の生育・収量には影響しない。 ②砂質土壌では使用しない。 ③散播栽培で覆土を行わない場合は使用を避ける。 ④麦出芽後は使用しない。 ⑤後作にアブラナ科、ウリ科、ナス科、マメ科作物を作付する場合、処理後3ヶ月以上空
クリアターン乳剤 (小麦)(大麦)	ベンチオカーブ ベンディメタリン リニュロン	50 5 7.5	①砂質土壌では使用しない。 ②麦出芽後は使用しない。
【他の剤型】 細粒剤F (小麦)(大麦)	ベンチオカーブ ベンディメタリン リニュロン	8 0.8 1.2	
クロロIPC乳剤	IPC	45.8	①気温が20°C以下の条件で使用する。 ②雑草が成長すると効果が低下するので、雑草の発生始期までに処理を行う。 ①砂質土壌では使用しない。

(2) 播種後土壤処理剤 (その2)

薬剤名	成分名	含有 %	備考
ゴーゴーサン 乳剤30 (麦類:小麦を除く)(小麦)	ベンテイメリン	30	①キク科雑草とツユクサには効果が劣るのでこれらの雑草の優占圃場では使用しない。 ②砂質土壌では使用しない。
【他の剤型】 細粒剤F	ベンテイメリン	2	
サターンバアロ乳剤	プロメトリン ベンチオカーブ	5 50	①イネ科雑草に比べ、広葉雑草は効果が劣るので、広葉優先圃場では処理量を多くする。 ②乳剤の登録は壤土～埴土のみ。 ③砂質土壌では使用しない。
【他の剤型】 粒剤 (小麦)(大麦)	プロメトリン ベンチオカーブ	0.8 8	④できるだけ雑草発生前に使用する。
シナジオ乳剤 (小麦・大麦)	トリフルラリン IPC	33 11	①適用雑草ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科を除く ②雑草の発生後では効果が劣るので、散布は雑草の発生前に行う。 ③砂質土壌では使用しない。 ④麦出芽後は使用しない。
トレファノサイド乳剤 (麦類:小麦類を除く)(小麦)	トリフルラリン	44.5	①ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科雑草には効果が劣るので優占圃場では使用しない。 ②連年施用は入ヌメノテッポウに効果が劣ること(抵抗性の発生)があるので有効な剤と組み合わせる。 ③大麦には薬害を生じやすいので砂質土壌では使用しない。
【他の剤型】 粒剤2.5	トリフルラリン	2.5	
バンバン細粒剤F (小麦)(大麦)	エスプロカルブ ジフルフェニカン	6 0.15	①麦の葉身に白斑がみられることがあるが、その後の生育・収量には影響しない。 ②砂質土壌では使用しない。

(2) 播種後土壤処理剤 (その3)

薬剤名	成分名	含有 %	備考
ボクサー(乳剤) (麦類:小麦を除く)(小麦) (大麦)	プロスルホカルブ	78.4	<ul style="list-style-type: none"> ①麦類に一過性の薬害(黄斑、縮葉)を生ずることがあるが、その後の生育・収量には影響しない。 ②砂質土壌では使用しない。 ③散播栽培で覆土を行わない場合は使用を避ける。 ④ミノフスマには効果低い。
ムギレンジャー乳剤 (小麦)(大麦)	プロスルホカルブ リニュロン	46 11.5	<ul style="list-style-type: none"> ①後作にアブラナ科、ウリ科、ナス科、マメ科作物を作付する場合、処理後3ヶ月以上空 ②砂質土壌では使用しない。 ③砂壤土では黄化、生育抑制を生じる場合があるので登録範囲内の低めの薬量で使用する。
リベレーターフロアブル (小麦)(大麦)	ジフルフェニカン フルフェナセット	8.4 33.6	<ul style="list-style-type: none"> ①白斑症状の薬害を生じることがあるが、その後の生育・収量には影響しない。 ②薬量を遵守し、砂質系土壌では登録範囲内の少ない方の薬量で使用する。砂質土壌では使用しない。 ③火山性土(黒ボク土等)での使用は、薬害を生じる恐れがあるので事前に薬害の有無を確認し、薬害を生じた場合には使用を避ける。 ④排水不良田など土壌が極端に湿っている時、また、散布後に大量の降雨が予想される場合は使用を避ける。
【他の剤型】 G(粒剤) (小麦)(大麦)	ジフルフェニカン フルフェナセット	0.2 0.6	

(2) 生育期処理剤 (その1)

薬剤名	成分名	含有 %	備考
バサグラン液剤 (麦類:小麦を除く)(小麦)	ベンタゾン	40	①接触型除草剤で、イネ科雑草には効果が無く、広葉雑草に対して効果が高い(ヤエムグラ、カラスノエンドウ6葉期まで) ②軽微な葉枯れが発生することがあるが、その後の生育に影響はない。
ハーモニー細粒剤F (小麦)(大麦)	チフェンスルフロンメチル	0.15	①砂質土壌では使用しない。 ②イネ科、広葉の同時防除が可能である。ただし、ヤエムグラに効果が劣る場合がある。 ③播種後の単用処理で使用できる。 ④連年施用はスズメノテッポウに効果が劣ること(抵抗性の発生)があるので有効な剤と組み合わせる。 ⑤麦の葉の黄化や生育抑制等の薬害が発生する事があるので処理量、処理時期は厳守する。 ⑥周辺の農作物等に飛散しないよう注意する。
ハーモニー75DF (小麦)(大麦)	チフェンスルフロンメチル	75	①砂質土壌では使用しない。 ②スズメノテッポウ5葉期、ヤエムグラ4節期までの処理でイネ科、広葉の同時防除が可能である。ただし、カラスノエンドウには効果が劣る。 ③連年施用はスズメノテッポウに効果が劣ること(抵抗性の発生)があるので有効な剤と組み合わせる。 ④体系処理でも効果が高いが、播種直後処理の補完除草としてのスポット処理、播種直後の除草剤散布を省略した生育期の単用処理も可能である。 ⑤使用量が極めて少量なので計量には留意する。 また、少量のぬるま湯で完全に溶解してから散布用の水に配合し速やかに散布す ⑥麦の葉の黄化や生育抑制等の薬害が発生する事があるので処理量、処理時期は厳守する。 ⑦散布時の飛散で周辺野菜の生育抑制等の薬害が出やすいため注意する(飛散防止バルの使用) ⑧散布後は速やかに消石灰で機械を洗浄する。

(2) 生育期処理剤 (その2)

薬剤名	成分名	含有 %	備考
MCPソーダ塩	MCPAナトリウム塩	19.5	①ホルモン型、吸収移行型の選択性除草剤であり、使用時期(幼穂形成期)を守る ②低温時は効果が劣るため注意する。

麦除草剤

1. 使用上の注意

- (1)指定された使用時期を失しないように散布する。
- (2)碎土、整地はできるだけていねいに行い、土壤表面をなるべく均平にする。
- (3)なるべく細かく碎いた土でていねいに覆土し、覆土深は必ず2~3cmとする。
- (4)周辺作物に散布液がかからないように、均一に散布する。
- (5)土壤が極端に乾燥している場合は効果が劣ることがあるので、登録の範囲内で希釈水量を多めに散布する(乳剤、水和剤)か、適度に湿っている時に使用する(粒剤)
- (6)排水不良田や散布前後に激しい降雨が予想される時には使用をさける。(薬害)
- (7)散布時の強風による散布ムラに留意する。

2. 麦の主要雑草と防除対策について

(1)スズメノテッポウ

【生態】イネ科、越年生。水田裏作麦では、優先雑草となっており、雑草害も著しい。近年、チフェンスルフロンメチル、トリフルラニンへの抵抗性個体が確認されている。

【防除】抵抗性個体が確認された場合は防除効果が認められる剤へ切り替える。播種前に既に大量に発生している場合は、耕起前にラウンドアップマックスロード液剤等を散布する。

(2)ヤエムグラ

【生態】アカネ科、越年生。発生期間が長く、麦にからみついで成育することから、収穫作業の障害となり、種子が収穫麦に混入する場合がある。

【防除】播種後土壤処理剤のみでは防除が困難な場合が多く、生育中期の除草剤処理が必要となる。

(3)カラスノエンドウ

【生態】マメ科、越年生。種子が大きく収穫麦に混入しやすいため、特に防除の徹底が必要となる。土中の深い位置からも発生し、発生期間が長い。

【防除】播種後土壤処理剤と生育期処理との体系処理を実施する。

(4)カズノコグサ

【生態】イネ科、越年生。土壤水分の高い圃場での発生が多い。幼植物はスズメノテッポウに似ているが、生育後期には麦より大きくなり麦の減収を招く。

【防除】播種後土壤処理剤のみでは効果が低いので、イネ科雑草に効果のある剤を生育期に処理(ハーモニー75DF水和剤が比較的有効)する。

(5)タデ類

【生態】タデ科、一年生。やや湿潤な条件を好み、出芽深度が深く、生育中期から発生するため土壤処理剤のみでは効果が期待できない。

【防除】土入れ・中耕の効果が高い。雑草の発生時期に生育期処理(ハーモニー75DF水和剤(発生直前)、バサグラン液剤(発生盛期以降)が比較的効果高い)を行う。

(6)ネズミムギ・カラスマギ

【生態】イネ科、越年生。土中深い位置から発生し、発生期間が長いことから既存除草剤では十分な効果が期待できない。

【防除】水稻作付等による夏期湛水(ネズミムギは60日以上の連続した湛水が必要)により種子はほぼ死滅する。圃場内に蔓延する前に手取り除草する。播種後土壤処理剤ではリベレーターフロアブル(G)が比較的効果高い。